

Résultats du suivi IBS en période d'étiage Centre minier de Thio plateau Septembre 2019

CONSULTANTS

# Sommaire

<u>1</u>	BILAN DE LA CAMPAGNE	
1.1	RESULTATS IBS PAR STATION	
	CONDITIONS GENERALES DE LA CAMPAGNE	
	RESULTATS BIOLOGIQUES PAR STATION	
<u>2</u>	PRESENTATION DES STATIONS	5
2.1	STATION TOMURU AMONT	6
2.2	STATION MUE	12
	STATION ST MARTIN	
2.4	STATION NEDORO	19
	STATION NGERE	
2.6	STATION HGL	26
2.7	STATION MEE	27
2.8	STATION MOULINET	33
<u>3</u>	EVOLUTION DES RESULTATS	38



### 1 BILAN DE LA CAMPAGNE

# 1.1 RESULTATS IBS PAR STATION

La figure suivante présente les résultats IBS pour les stations suivies sur ce massif.




Figure 1 : Carte générale des stations par site avec les résultats IBS.



# 1.2 CONDITIONS GENERALES DE LA CAMPAGNE

Le tableau suivant résume les conditions générales des stations de suivi IBS de la campagne « étiage 2019 ».

Tableau 1 : conditions générales de la campagne « étiage 2019 ».

Site minier	Stations	Date	Accès à la station	Heure	Températur e (°C)	Conductivit é (µS/cm)	рН	O2 (mg/l)	DO%	Redox (mV)	Turbidit é (NTU)	Couleu r de l'eau	Conditio n météo	Observation s
Thio Plateau	Tomuru amont	17/09/2019	Voie terrestre	12 :00	18,20	453	8,05	6,76	71,20	402	5	Claire	soleil	
Thio Plateau	Mue	17/09/2019	Voie terrestre	10:00	21,3	154	8,5	7,4	84,6	382	11,8	claire	soleil	
Thio Plateau	St Martin	17/09/2019	Voie terrestre											à sec
Thio Plateau	Nedoro	17/09/2019	Voie terrestre											à sec
Thio Plateau	Ngere	17/09/2019	Voie terrestre	16:00	23,9	188	8,0	6,69	78,1	412	194	claire	soleil	
Thio Plateau	HGL	19/09/2019	Voie terrestre											à sec
Thio Plateau	Mee	16/09/2019	Voie terrestre	13:50	20,4	210	8,5	8,16	89,8	385	1,5	claire	soleil	
Thio Plateau	Moulinet	17/09/2019	Voie terrestre	08:00	18,5	240	8,69	7,79	83,1	388	8,4	claire	soleil	_



### 1.3 RESULTATS BIOLOGIQUES PAR STATION

Le tableau suivant résume les paramètres biologiques des stations de suivi IBS de la campagne « étiage 2019 ».

Tableau 2 : résultats biologiques par station – campagne « étiage 2019 »

THIO PLATEAU	TOMURU AMONT	MUE	ST MARTIN	NEDORO	NGERE	HGL	MEE	MOULINET
Abondance (nb d'ind.)	353	281			89		252	123
Densité (nb d'ind./m²)	1008,57	802,86			254,29		720	351,43
Richesse taxonomique:								
Nombre de taxon (N)	38	30			14	4,7	27	13
Indice de Margalef	6,31	5,14	A sec		2,90		4,70	2,49
Diversité biologique:				A sec	1,80			
Indice de Shannon (H')	2,83	2,63		A Sec			2,84	1,49
Equitabilité de Pielou (E)	0,78	0,77			0,68		0,86	0,58
Indice EPT	16	12			5		14	5
Taux de larves de Chironomidae (%)	2,27	21,35			16,85		3,17	12,20
Note IBNC	5,92	4,86			5,64		5,15	5
Note IBS	5,92	5,66			4,57		5,85	4,77

# **2 PRESENTATION DES STATIONS**

La figure suivante présente le plan de situation des stations IBS de ce massif.



Figure 2 : plan de situation des stations de suivi biologique.


Les coordonnées géographiques des stations IBS sont données dans le tableau ci-dessous :

Tableau 3 : coordonnées géographiques des stations de suivi biologique.

Site minier	Stations	Х	Y
	Tomuru amont	417118	286060
	Mue	420031	284820
	St Martin	421057	286889
This Distance	Nedoro	419980	286086
Thio Plateau	Ngere	421422	287610
	HGL	416680	288945
	Mee	415623	289206
	Moulinet	420748	286409

### 2.1 STATION TOMURU AMONT

La carte de localisation de la station est présentée ci-dessous.



La fiche de relevés terrain et le bulletin d'analyse biologique de la campagne « étiage 2019 » sont présentés ci-après.

# RELEVÉS TERRAIN 2016 DONNÉES MÉSOLOGIQUES ET FAUNISTIQUES

1-IDENTIFICATION DU POINT DE PRÉLÈVEMENT									
Commune :	Thio		Bassin versant :	Thio					
Nom du cours d'eau :	Xwê Tômurû		Date :	17/09/2019					
Point de prélèvement (nom ou code) :	Tomuru Amont		Tomuru Amont		Heure :	12 h 00			
Organisme préleveur:	BIOEKO		Prélèvement fait par :	NE					
Coordonnées du point de prélèvement:  Carte IGN  X Aval (m) : 41  Y Amont (m) :			Y Aval (m): 285 948 Y Amont (m): 0						
Système de réf./projection X Y :	RGNC91-93 Lambert NC								
Altitude sur carte IGN	0 m								

2- ENVIRONNEMENT GÉNÉRAL	
Environnement global rive droite	forêt
Environnement global rive gauche	forêt
Pente au point de prélèvement	moyenne
Ganulométrie dominante	blocs
Substrat du B.V. au point de prélèvement	ultramafique
Point de prélèvement sous influence	Sédimentaire -> Ultramafique
Sources d'interférence	
Phénomène anormal observé	

# 3- CONDITIONS D'OBSERVATION

Hydrologie : Etiage sévère

Traces de laisses de crues récentes ou pluie importante ayant précédé l'échantillonnage : Non

Conditions climatiques : soleil

Couleur eau : claire Fond visible : Oui

4- CARACTÉRISATION PHYSICO-CHIMIQUE DU POINT DE PRÉLÈVEMENT										
	Appareil Propriétaire		Valeurs mesurées in situ	Date dernier étalonnage	Contrôle sonde après terrain	Qualité de la mesure				
Conductivité	Conductivité Quanta Biokeo			16/09/2019	Oui					
Oxygène dissous	Quanta	Biokeo	6,76 mg/L 71 % 0°C	16/09/2019	Oui					
pH / Rédox	Quanta	Biokeo	8,0 Unité 402,00 mV	16/09/2019	Oui					
Turbidité	Quanta	Biokeo	5 NTU	16/09/2019	Oui					
Prélèvement d'eau	Oui, Effectué par : NE heure prélèvement : 12:00 distance /berge (m) : 0		profondeur eau (m): 0	Analyse MES : Autres analyses Analyses bacté Laboratoire d'an	Oui					

5- DESCRIPTION DU POINT DE PRELEVEMENT									
Longueur approximative du bief échantilloné	50,00 m	Faciés d'écoulement : Mouille; Rapide	Nombre de séquences : 2						
Largeur minimale du lit mouillé	0,30 m	Profondeur minimale	0,05 m						
Largeur maximale du lit mouillé	3,00 m	Profondeur maximale	0,25 m						
Largeur moyenne du lit mouillé	1,20 m	Sur-engravement du lit : Oui	nent du lit : Oui						
Distance entre les 2 berges	15,00 m	% d'ombrage du lit mouillé	60 %						

Granulométrie des sédiments de la partie non mouillée du lit : R/D : Roche/Dalle; B : Blocs (>250 mm); P/G : Pierres et Galets (25-250mm); Gr : Graviers (0.05-25mm)

#### Berges / Rives

		Berge Structure	e gauche e : naturelle				Berge droite Structure : naturelle							
Pente : verticale							Pente : verticale							
	%Art	%R/D	%В	%P/G	%Gr	%S/L	%Tr	%La	Végétation	% couverture par la végétation				
Rive droite	0	0	20	0	0	0	80	0	arborée	100				
Rive gauche	0	20	30	0	0	0	50	0	arborée	90				

 $Art: Substrats \ artificiels\ ;\ R/D: Roches/Dalles\ ;\ B: Blocs\ (>250\ mm)\ ;\ P/G: Pierres\ et\ galets\ (25\ \grave{a}\ 250\ mm)\ ;\ Gr: Graviers\ (2\ \grave{a}\ 25\ mm)\ ;\ S/L: Sables\ et\ limons\ (<2\ mm)\ ;\ Tr: terre\ (<2\ mm)\ ;\ La: latérites\ (<2\ mm).$ 

#### Lit mouillé

Matiere organique vegetale Feuilles Importance faible
-------------------------------------------------------

Fréquentation animale ou humaine :

#### Etat du substrat :

Latérites	zones lotiques	zones lentiques	globalement sur le site	
% de dépôts latéritiques	0	0	0	
Colmatage (+,++,+++)				

<sup>+ :</sup> couche facilement déplaçable ; ++ quelques mm d'épaisseur ; +++ plus d'un cm d'épaisseur

Remarques description du point de prélèvement :

6- REPÉRAGE DES SUBSTRATS (REPRÉSENTATIVITÉ) ET DES CLASSES DE VITESSE DE COURANT													
	Ocholost			Vitesse (V) en cm/s									
Habitabilité	Substrat (Granulométrie le cas échéant)	% de recouvrement	Représentativité (M,D)	Cascade V>150	Rapide 150>V>75	Moyenne 75>V>25	Faible à nulle V<25						
11	Bryophytes	0											
10	Branchages, troncs	0											
9	Pierres, galets (25 à 250)	15	D			1	2						
8	Litières (+vase)	1	М				1						
7	Hydrophytes	0											
6	Chevelus racinaires	0											
5	Blocs soulevables à la main (> 250 mm)	30	D			2	1						
4	Graviers (2 à 25 mm)	32	D			2	1						
3	Sables (< 2 mm)	15	D				1						
2	Fines latéritiques (< 2 mm)	0											
1	Roches, dalles	7	D			2	1						
0	Algues	0											

Les classes de vitesse caractérisant chaque substrat sont identifiées selon leur ordre d'importance (1, 2, 3 ou 4), la valeur la plus faible correspondant à la classe la plus représentée. M : Marginal : substrat occupant moins de 5% de la superficie totale mouillée du point de prélèvement (< 5%) ; D : Dominant : substrat occupant 5% et plus de 5% de la superficie totale mouillée du point de prélèvement (5%).

7- TABLEA	U D'ÉCHANTIL	LONNAGE							
			Vitesse		Sub	strat	Végétation aquatique		
	Prélèvement	Substrat	du courant	Hauteur d'eau (cm)	Colmatage	Stabilité	Nature	Abondance (%)	
	P1	Litières(+vase)	faible	15	nul	instable		0	
Phase 1	P2	Litières(+vase)	faible	20	faible	moyennem ent stable		0	
	P3	Litières(+vase)	faible	25	faible	instable		0	
	P4	Graviers	faible	8	nul	instable		0	
	P5	Graviers	moyenne	5	nul	moyennem ent stable		0	
Phase 2	P6	Blocs soulevables à la main	faible	15	nul	stable		0	
	P7	Pierres, galets	moyenne	5	nul	moyennem ent stable		0	
	Nombre de fla	cons prélevés : 7			Echantillons fixés dans : Ethanol				
	Remarques re	elatives à l'échantillo	nnage et aux	conditions de	prélèvement	•			

### **BULLETIN D'ANALYSE BIOLOGIQUE**

Rivière : Xwê Tômurû Date prélèvement : 17/09/2019

Station: Tomuru Amont Heure: 12:00

Substrat station: ultramafique X aval (m): 417 204 X amont (m): 0

Commande : 2969 - Qualité des eaux SLN 2017 -2020 y aval (m) : 285 948 y amont (m) : 0

Prélèvement effectué par : NE Ref. XY : RGNC91-93 Lambert NC

Analyse effectuée par : Validée par :


	Scores	Scores	1	2	3	4	5	6	7		
Ahr Nom Toyon	IBNC 2016	IBS	<u> </u>						<u> </u>	Nb	Abon
Abr. Nom Taxon	2016	2016								Indiv	relat
Hyi - Mollusque Gastéropode Tateidae (Hydrobiidae) indéterminé	8	4	11	26	2	1	6		5	51	14,45%
Mel - Mollusque Gastéropode Thiaridae Melanopsis Melanopsis spp.	7	9	25	12			1	5	2	45	12,75%
Gyl - Mollusque Gastéropode Planorbidae Gyraulus Gyraulus spp.	6	10	1	2		1	1			5	1,42%
Amf - Crustacé Amphipode indéterminé	7	3					1			1	0,28%
Hyd - Hydracarien indéterminé	5	4	4	1	2					7	1,98%
Lep - Ins. Lépidoptère indéterminée Indéterminé	6	4	1							1	0,28%
Amo - Ins. Ephéméroptère Leptophlebiidae Amoa Amoa sp.	8	9		30	1					31	8,78%
Cep - Ins. Ephéméroptère Leptophlebiidae Celiphlebia Celiphlebia sp.	6	7	1							1	0,28%
Fas - Ins. Ephéméroptère Leptophlebiidae Fasciamirus Fasciamirus rae Peters, Peters & Edmunds 1990	10	6	1	1		5	3	3		13	3,68%
Kou - Ins. Ephéméroptère Leptophlebiidae Kouma Kouma sp.	7	10					4			4	1,13%
Ng4 - Ins. Ephéméroptère Leptophlebiidae Neampia sp. Neampia sp.	7	9	4		15	4	10	2		35	9,92%
Par - Ins. Ephéméroptère Leptophlebiidae Paraluma Paraluma sp.	5	4	9	1		7		1		18	5,10%
Iso - Ins. Odonate Isostictidae Isosticta Isosticta spp.	7	9	10	12	4	4			1	31	8,78%
Mes - Ins. Hétéroptère Mesoveliidae Mesovelia Mesovelia spp.	8	4			2					2	0,57%
Not - Ins. Hétéroptère Notonectidae indéterminé	7	10	1							1	0,28%
Vel - Ins. Hétéroptère Veliidae indéterminé	5	9				1	1		1	3	0,85%
Hya - Ins. Coléoptère Hydraenidae Hydraena Hydraena spp.	6	5					3		1	4	1,13%
Hyf - Ins. Coléoptère Hydrophilidae indéterminé	3	3				1				1	0,28%
Ecn - Ins. Trichoptère Ecnomidae indéterminé	6	4			1					1	0,28%
Hep - Ins. Trichoptère Helicopsychidae Helicopsyche Helicopsyche spp.	6	9	13		7		3		2	25	7,08%
Hyb - Ins. Trichoptère Hydrobiosidae indéterminé	5	7				2				2	0,57%
Hyp - Ins. Trichoptère Hydropsychidae indéterminé	5	5					1		3	4	1,13%
Hyt - Ins. Trichoptère Hydroptilidae indéterminé	4	2	1			3		1		5	1,42%
Kok - Ins. Trichoptère Kokiriidae Mecynostomella Mecynostomella spp.	10	9				1				1	0,28%
Sym - Ins. Trichoptère Leptoceridae Symphitoneuria Symphitoneuria spp.	9	6		2	1					3	0,85%
Tri - Ins. Trichoptère Leptoceridae Triplectides Triplectides spp.	5	7	11	18	4	1				34	9,63%

Oec - Ins. Trichoptère Leptoceridae Oecetis Oecetis spp.	5	6	1	2		1				4	1,13%
Pol - Ins. Trichoptère Polycentropodidae indéterminé	7	8	3							3	0,85%
For - Ins. Diptère Ceratopogonidae Forcipomyinae indéterminé	7	5	2							2	0,57%
Tan - Ins. Diptère Chironomidae Tanytarsini indéterminé	2	4					2			2	0,57%
Har - Ins. Diptère Chironomidae Harrisius Harrisius spp.	5	4			1					1	0,28%
Oto - Ins. Diptère Chironomidae Orthocladiinae indéterminé	1	2		1						1	0,28%
Tap - Ins. Diptère Chironomidae Tanypodinae Tanypodinae indéterminé	5	3	1	1	1			1		4	1,13%
Psy - Ins. Diptère Psychodidae indéterminé	1	8					2			2	0,57%
Dix - Ins. Diptère Dixidae indéterminé	9	5	2							2	0,57%
Str - Ins. Diptère Stratiomyidae indéterminé	2	4	1							1	0,28%
Rha - Ins. Diptère Rhagionidae indéterminé	10	5							1	1	0,28%
Cec - Ins. Diptère Cecidomyiidae indéterminé	3	3				1				1	0,28%
Abondance (nb d'individus sur la station) :	3	353	Richesse taxonomique (nb de taxons) : 38								
Densité (nb d'individus par m²) :	1008	,57	Nombre de taxons participant au calcul de l'IBNC 2016:								38
INDICE EPT: (indice éphéméroptères, plécoptères et trichoptères)		16	Nombre de taxons participant au calcul de l'IBS 2016: 38								38
Abondance relative en diptères Chironomidae (%):	2	,27									
INDICE Margalef:	6	,31									
INDICE Shannon (H):	2	,83									
Equitabilité de Pielou (E) :	0	,78									
*Les habitats marginaux (couvrant moins de 5% de la surface du de 50% du lit mouillé, D2 entre 25 et 50% et D1 entre 5 et 25%.	lit moillé) so	nt désignés	par la lettre	M, les h	abitats do	minants s	ont désig	nés par la	a lettre D,	D3 s'ils couv	rent plus
INDICE BIOTIQUE DE NC (IBNC) 2016 :	5,9	2	QUALIT	ΓÉ ΒΙΟΙ	LOGIQ	UE TRI	ÉS BOI	NNE			
INDICE BIOSEDIMENTAIRE (IBS) 2016 :	5,9	2	QUALIT	ΓÉ ΒΙΟΙ	LOGIQ	UE BO	NNE				

Remarques :

# 2.2 STATION MUE

La carte de localisation de la station est présentée ci-dessous.



La fiche de relevés terrain et le bulletin d'analyse biologique de la campagne « étiage 2019 » sont présentés ci-après.

# RELEVÉS TERRAIN 2016 DONNÉES MÉSOLOGIQUES ET FAUNISTIQUES

1-IDENTIFICATION DU POINT DE PRÉLÈVEMENT								
Commune :	Thio		Bassin versant :	Xwê Mué				
Nom du cours d'eau :	Xwê Mué		Date :	17/09/2019				
Point de prélèvement (nom ou code) :	MUE		Heure :	14 h 20				
Organisme préleveur:	BIOEKO		Prélèvement fait par :	NE				
Coordonnées du point de prélèvement:	Carte IGN	X Aval (m): Y Amont (m)		Y Aval (m): 284 820 Y Amont (m): 0				
Système de réf./projection X Y :	RGNC91-93 Lambert NC							
Altitude sur carte IGN	0 m							

2- ENVIRONNEMENT GÉNÉRAL	2- ENVIRONNEMENT GÉNÉRAL						
Environnement global rive droite	végétation éparse						
Environnement global rive gauche	végétation éparse						
Pente au point de prélèvement	faible						
Ganulométrie dominante	roches/dalles						
Substrat du B.V. au point de prélèvement	ultramafique						
Point de prélèvement sous influence	Sédimentaire -> Ultramafique						
Sources d'interférence							
Phénomène anormal observé							

#### 3- CONDITIONS D'OBSERVATION

Hydrologie: Etiage normal

Traces de laisses de crues récentes ou pluie importante ayant précédé l'échantillonnage : Non

Conditions climatiques : soleil

Couleur eau : claire Fond visible : Oui

4- CARACTÉRISATION PHYSICO-CHIMIQUE DU POINT DE PRÉLÈVEMENT										
	Appareil terrain	Propriétaire	Valeurs mesurées in situ	Date dernier étalonnage	Contrôle sonde après terrain	Qualité de la mesure				
Conductivité	Quanta	Bioeko	24,0 °C 156,000 μS/cm Temp. de Réf : 23,9 °C	16/09/2019	Oui					
Oxygène dissous	Quanta	Bioeko	7,50 mg/L 89 % 0°C	16/09/2019	Oui					
pH / Rédox	Quanta	Bioeko	8,1 Unité 416,00 mV	16/09/2019	Oui					
Turbidité	Quanta	Bioeko	5 NTU	16/09/2019	Oui					
Prélèvement d'eau	Oui, Effectué pa heure prélèvem distance /berge	ent : 14:20	profondeur eau (m) : 0	Analyse MES : Oui Autres analyses physico-chimiques : Oui Analyses bactériologiques : Non Laboratoire d'analyse : CDE						

C. DECODIDETION DI LIPONIT DE DDELEVEMENT									
5- DESCRIPTION DU POINT DE PRELEVEMENT									
Longueur approximative du bief échantilloné	100,00 m	Faciés d'écoulement : Mouille; Radie	Nombre de séquences : 2						
Largeur minimale du lit mouillé	2,50 m	Profondeur minimale	0,05 m						
Largeur maximale du lit mouillé	geur maximale du lit mouillé 4,00 m Profondeur maximale 0,30 m								
Largeur moyenne du lit mouillé	3,00 m	Sur-engravement du lit : Oui							
Distance entre les 2 berges	8,00 m	% d'ombrage du lit mouillé	0 %						
Granulométrie des sédiments de la partie non mouillée du lit : R/D : Roche/Dalle; B : Blocs (>250 mm); P/G : Pierres et Galets (25-250 mm)									

250mm)

#### Berges / Rives

Berge gauche Structure : naturelle							Berge droite Structure : naturelle				
Pente : inclinee							Pente : inclinee				
	%Art	%R/D	%B	%P/G	%Gr	%S/L	%Tr	%La	Végétation	% couverture par la végétation	
Rive droite	0	30	30	30	10	0	0	0	éparse	80	
Rive gauche	0	20	40	30	10	0 0 0 arborée				90	

 $Art: Substrats \ artificiels \ ; \ R/D: Roches/Dalles \ ; \ B: Blocs \ (> 250 \ mm) \ ; \ P/G: Pierres \ et \ galets \ (25 \ \grave{a} \ 250 \ mm) \ ; \ Gr: Graviers \ (2 \ \grave{a} \ 25 \ mm) \ ; \ S/L: Sables \ et \ limons \ (< 2 \ mm) \ ; \ Tr: terre \ (< 2 \ mm) \ ; \ La: latérites \ (< 2 \ mm).$ 

#### Lit mouillé

Matière organique végétale Feuilles Importance faible	
-------------------------------------------------------	--

Fréquentation animale ou humaine :

#### Etat du substrat :

Latérites	zones lotiques	zones lentiques	globalement sur le site	
% de dépôts latéritiques	20	100	40	
Colmatage (+,++,+++)	+	+	+	

<sup>+ :</sup> couche facilement déplaçable ; ++ quelques mm d'épaisseur ; +++ plus d'un cm d'épaisseur

Remarques description du point de prélèvement :

6- REPÉRAG	6- REPÉRAGE DES SUBSTRATS (REPRÉSENTATIVITÉ) ET DES CLASSES DE VITESSE DE COURANT										
	Cultistant				Vitesse (\	/) en cm/s					
Habitabilité	Substrat (Granulométrie le cas échéant)	% de recouvrement	Représentativité (M,D)	Cascade V>150	Rapide 150>V>75	Moyenne 75>V>25	Faible à nulle V<25				
11	Bryophytes	0									
10	Branchages, troncs	1	М								
9	Pierres, galets (25 à 250)	40	D			1	2				
8	Litières (+vase)	1	М				1				
7	Hydrophytes	0									
6	Chevelus racinaires	1	М				1				
5	Blocs soulevables à la main (> 250 mm)	30	D			1	2				
4	Graviers (2 à 25 mm)	24	D								
3	Sables (< 2 mm)	0									
2	Fines latéritiques (< 2 mm)	0									
1	Roches, dalles	4	М				1				
0	Algues	0									

Les classes de vitesse caractérisant chaque substrat sont identifiées selon leur ordre d'importance (1, 2, 3 ou 4), la valeur la plus faible correspondant à la classe la plus représentée. M : Marginal : substrat occupant moins de 5% de la superficie totale mouillée du point de prélèvement (< 5%) ; D : Dominant : substrat occupant 5% et plus de 5% de la superficie totale mouillée du point de prélèvement (5%).

7- TABLEA	U D'ÉCHANTIL	LONNAGE						
			Vitesse		Sub	strat	Végétation	aquatique
	Prélèvement	Substrat	du courant	Hauteur d'eau (cm)	Colmatage	Stabilité	Nature	Abondance (%)
	P1	Roches, dalles	faible	8	moyen	stable		0
Phase 1	P2	Litières(+vase)	faible	15	faible	instable		0
	P3	Chevelus racinaires	faible	10	fort	moyennem ent stable		0
	P4	Pierres, galets	moyenne	10	moyen			0
	P5	Pierres, galets	faible	25	moyen	stable		0
Phase 2	P6	Blocs soulevables à la main	moyenne	15	moyen			0
	P7	Graviers	faible	20	moyen			0
	Nombre de fla	icons prélevés : 7			Echantillons fixés dans : Ethanol			
	Remarques re	elatives à l'échantillo	nnage et aux	conditions de	prélèvement :	:		

### **BULLETIN D'ANALYSE BIOLOGIQUE**

Rivière : Xwê Mué Date prélèvement : 17/09/2019

Station: MUE Heure: 14:20

Substrat station: Ultramafique X aval (m): 420 031 X amont (m): 0

Commande : 2969 - Qualité des eaux SLN 2017 -2020 y aval (m) : 284 820 y amont (m) : 0

Prélèvement effectué par : NE Ref. XY : RGNC91-93 Lambert NC

Analyse effectuée par : Validée par :


	_	_									
	Scores IBNC	Scores IBS	1	2	3	4	5	6	7		
Abr. Nom Taxon	2016	2016								Nb Indiv	Abon relat
Aty - Crustacé décapode Atyidae indéterminé	5	7			1					1	0,36%
Hyd - Hydracarien indéterminé	5	4		7				1		8	2,85%
Lep - Ins. Lépidoptère indéterminée Indéterminé	6	4		1	1					2	0,71%
Amo - Ins. Ephéméroptère Leptophlebiidae Amoa Amoa sp.	8	9		14	4		1		5	24	8,54%
Cep - Ins. Ephéméroptère Leptophlebiidae Celiphlebia Celiphlebia sp.	6	7			17		1			18	6,41%
Par - Ins. Ephéméroptère Leptophlebiidae Paraluma Paraluma sp.	5	4		2	1		1			4	1,42%
Syn - Ins. Odonate Synthemistidae Synthemis Synthemis spp.	5	8	1							1	0,36%
Vel - Ins. Hétéroptère Veliidae indéterminé	5	9		1						1	0,36%
Hyf - Ins. Coléoptère Hydrophilidae indéterminé	3	3	1			3		1	1	6	2,14%
Hep - Ins. Trichoptère Helicopsychidae Helicopsyche Helicopsyche spp.	6	9				1				1	0,36%
Hyb - Ins. Trichoptère Hydrobiosidae indéterminé	5	7			1	1		1		3	1,07%
Hyp - Ins. Trichoptère Hydropsychidae indéterminé	5	5				5				5	1,78%
Hyt - Ins. Trichoptère Hydroptilidae indéterminé	4	2	5	18	11	7	9	9	4	63	22,42%
Sym - Ins. Trichoptère Leptoceridae Symphitoneuria Symphitoneuria spp.	9	6		1					1	2	0,71%
Tri - Ins. Trichoptère Leptoceridae Triplectides Triplectides spp.	5	7		1	5		4		2	12	4,27%
Gra - Ins. Trichoptère Leptoceridae Gracilipsodes Gracilipsodes spp.	6	8				2				2	0,71%
Oec - Ins. Trichoptère Leptoceridae Oecetis Oecetis spp.	5	6	3	2	4				1	10	3,56%
Pol - Ins. Trichoptère Polycentropodidae indéterminé	7	8		1	1					2	0,71%
Sim - Ins. Diptère Simuliidae Simulium Simulium spp.	2	5				44			2	46	16,37%
Das - Ins. Diptère Ceratopogonidae Dasyheleinae indéterminé	0	0				1				1	0,36%
Cer - Ins. Diptère Ceratopogonidae Ceratopogoninae indéterminé	5	2		1	1			1	1	4	1,42%
For - Ins. Diptère Ceratopogonidae Forcipomyinae indéterminé	7	5						1		1	0,36%
Tan - Ins. Diptère Chironomidae Tanytarsini indéterminé	2	4	14	9	7	1	2			33	11,74%
Har - Ins. Diptère Chironomidae Harrisius Harrisius spp.	5	4		3	2					5	1,78%
Cor - Ins. Diptère Chironomidae Corynoneura Corynoneura spp.	5	6			1	1				2	0,71%
Oto - Ins. Diptère Chironomidae Orthocladiinae indéterminé	1	2	4		1		2	4	1	12	4,27%
Tap - Ins. Diptère Chironomidae Tanypodinae Tanypodinae indéterminé	5	3		6	2					8	2,85%

Psy - Ins. Diptère Psychodidae indéterminé	1	8	1							1	0,36%
Tab - Ins. Diptère Tabanidae sp.	5	6				2				2	0,71%
Lim - Ins. Diptère Limoniidae indéterminé	3	6		1						1	0,36%
Abondance (nb d'individus sur la station) :	2	281	Richess	se taxor	nomiqu	e (nb d	e taxon	s):			30
Densité (nb d'individus par m²) :	802	,86	Nombre 2016:	de tax	ons pa	rticipan	t au ca	lcul de	l'IBNC		29
INDICE EPT: (indice éphéméroptères, plécoptères et trichoptères)						I'IBS 20	)16:	29			
Abondance relative en diptères Chironomidae (%):	21	,35									
INDICE Margalef:	5	,14									
INDICE Shannon (H):	2	,63									
Equitabilité de Pielou (E) :	0	,77									
*Les habitats marginaux (couvrant moins de 5% de la surface d de 50% du lit mouillé, D2 entre 25 et 50% et D1 entre 5 et 25%.	ı lit moillé) soı	nt désignés	par la lettre	M, les ha	abitats do	minants s	ont désig	nés par la	a lettre D,	D3 s'ils couv	rent plus
INDICE BIOTIQUE DE NC (IBNC) 2016 :	4,80	6	QUALIT	É BIOI	_OGIQI	UE PAS	SSABLI	E			
INDICE BIOSEDIMENTAIRE (IBS) 2016 :	5,60	6	QUALIT	É BIOI	_OGIQ	UE BO	NNE				

Remarques:

# 2.3 STATION ST MARTIN


La carte de localisation de la station est présentée ci-dessous.



Le creek étant à sec le jour de la campagne terrain (17/09/2019), aucun prélèvement n'a pu être effectué.

# 2.4 STATION NEDORO


La carte de localisation de la station est présentée ci-dessous.



Le creek étant à sec le jour de la campagne terrain (17/09/2019), aucun prélèvement n'a pu être effectué. A noter également un accès à la station de suivi dangereux.

# 2.5 STATION NGERE

La carte de localisation de la station est présentée ci-dessous.



La fiche de relevés terrain et le bulletin d'analyse biologique de la campagne « étiage 2019 » sont présentés ci-après.

# RELEVÉS TERRAIN 2016 DONNÉES MÉSOLOGIQUES ET FAUNISTIQUES

1-IDENTIFICATION DU F	1-IDENTIFICATION DU POINT DE PRÉLÈVEMENT									
Commune :	Thio		Bassin versant :	Xwê Ngerê						
Nom du cours d'eau :	Xwê Ngerê		Date :	17/09/2019						
Point de prélèvement (nom ou code) :	NGERE		Heure :	16 h 00						
Organisme préleveur:	BIOEKO		Prélèvement fait par :	NE						
Coordonnées du point de prélèvement:	Carte IGN	X Aval (m) : Y Amont (m)		Y Aval (m): 287 610 Y Amont (m): 0						
Système de réf./projection X Y :	RGNC91-93 Lambert NC									
Altitude sur carte IGN	0 m									

2- ENVIRONNEMENT GÉNÉRAL						
Environnement global rive droite	végétation arbustive					
Environnement global rive gauche	végétation arbustive					
Pente au point de prélèvement	moyenne					
Ganulométrie dominante	roches/dalles					
Substrat du B.V. au point de prélèvement	ultramafique					
Point de prélèvement sous influence	Sédimentaire -> Ultramafique					
Sources d'interférence						
Phénomène anormal observé						

3- CONDITIONS D'OBSERVATION
Hydrologie: Etiage normal
Traces de laisses de crues récentes ou pluie importante ayant précédé l'échantillonnage : Non
Conditions climatiques : soleil

Couleur eau : claire Fond visible : Oui

4- CARACTÉRIS	SATION PHYSICO	4- CARACTÉRISATION PHYSICO-CHIMIQUE DU POINT DE PRÉLÈVEMENT												
	Appareil terrain	Propriétaire	Valeurs mesurées in situ	Date dernier étalonnage	Contrôle sonde après terrain	Qualité de la mesure								
Conductivité	Quanta	Bioeko	23,0 °C 188,000 μS/cm Temp. de Réf : 22,9 °C	16/09/2019	Oui									
Oxygène dissous	Quanta	Bioeko	6,69 mg/L 78 % 0°C	16/09/2019	Oui									
pH / Rédox	Quanta	Bioeko	8,0 Unité 412,00 mV	16/09/2019	Oui									
Turbidité	Quanta	Bioeko	19 NTU	16/09/2019	Oui									
Prélèvement d'eau	Oui, Effectué pa heure prélèvem distance /berge	ent : 16:00	profondeur eau (m) : 0		s physico-chimiques : riologiques : Non	Oui								

5- DESCRIPTION DU POINT DE PRELEVEMENT									
Longueur approximative du bief échantilloné	50,00 m	Faciés d'écoulement : Mouille; Rapide	Nombre de séquences : 2						
Largeur minimale du lit mouillé	0,15 m	Profondeur minimale	0,02 m						
Largeur maximale du lit mouillé	3,50 m	Profondeur maximale	0,00 m						
Largeur moyenne du lit mouillé	1,20 m	Sur-engravement du lit : Non							
Distance entre les 2 berges	% d'ombrage du lit mouillé	0 %							

Granulométrie des sédiments de la partie non mouillée du lit : R/D : Roche/Dalle; B : Blocs (>250 mm); P/G : Pierres et Galets (25-250mm); Gr : Graviers (0.05-25mm)

#### Berges / Rives

		Berge Structure	e gauche e : naturelle				Berge droite Structure : naturelle					
Pente : verticale							Pente : verticale					
	%Art	%R/D	%В	%P/G	%Gr	%S/L	%Tr	%La	Végétation	% couverture par la végétation		
Rive droite	0	50	30	20	0	0	0	0	arbustive	60		
Rive gauche	0	70	20	5	0	0	5	0	arbustive	80		

 $Art: Substrats \ artificiels\ ;\ R/D: Roches/Dalles\ ;\ B: Blocs\ (>250\ mm)\ ;\ P/G: Pierres\ et\ galets\ (25\ \grave{a}\ 250\ mm)\ ;\ Gr: Graviers\ (2\ \grave{a}\ 25\ mm)\ ;\ S/L: Sables\ et\ limons\ (<2\ mm)\ ;\ Tr: terre\ (<2\ mm)\ ;\ La: latérites\ (<2\ mm).$ 

#### Lit mouillé

Matière organique végétale	Feuilles	Importance	faible

Fréquentation animale ou humaine :

Etat du substrat : Dépots latéritiques

Latérites	zones lotiques	zones lentiques	globalement sur le site	
% de dépôts latéritiques	50	100		
Colmatage (+,++,+++)	+	+	+	

<sup>+ :</sup> couche facilement déplaçable ; ++ quelques mm d'épaisseur ; +++ plus d'un cm d'épaisseur

Remarques description du point de prélèvement :

6- REPÉRAG	6- REPÉRAGE DES SUBSTRATS (REPRÉSENTATIVITÉ) ET DES CLASSES DE VITESSE DE COURANT												
	Cultistant			Vitesse (V) en cm/s									
Habitabilité	Substrat (Granulométrie le cas échéant)	% de recouvrement	Représentativité (M,D)	Cascade V>150	Rapide 150>V>75	Moyenne 75>V>25	Faible à nulle V<25						
11 Bryophytes		0											
10	10 Branchages, troncs												
9 Pierres, galets (25 à 250)		20	D				1						
8	8 Litières (+vase)		М				1						
7	Hydrophytes	0											
6	Chevelus racinaires	0											
5	Blocs soulevables à la main (> 250 mm)	10	D				1						
4	Graviers (2 à 25 mm)	4	М				1						
3	Sables (< 2 mm)	0											
2 Fines latéritiques (< 2 mm)		0											
1	Roches, dalles	65	D			2	1						
0 Algues		0											

Les classes de vitesse caractérisant chaque substrat sont identifiées selon leur ordre d'importance (1, 2, 3 ou 4), la valeur la plus faible correspondant à la classe la plus représentée. M : Marginal : substrat occupant moins de 5% de la superficie totale mouillée du point de prélèvement (< 5%) ; D : Dominant : substrat occupant 5% et plus de 5% de la superficie totale mouillée du point de prélèvement (5%).

7- TABLEAU D'ÉCHANTILLONNAGE											
			Vitesse		Sub	strat	Végétation aquatique				
	Prélèvement	Substrat	du courant	Hauteur d'eau (cm)	Colmatage	Stabilité	Nature	Abondance (%)			
	P1	Graviers	faible	20	faible	instable		0			
Phase 1	P2	Litières(+vase)	faible	35	moyen	instable		0			
	P3	Graviers	faible	10	moyen	instable		0			
	P4	Roches, dalles	moyenne	2	faible	stable		0			
	P5	Roches, dalles	faible	15	moyen	stable		0			
Phase 2	P6	Pierres, galets	faible	10	moyen	stable		0			
	Blocs P7 soulevables à la faible main		20	moyen	stable		0				
	Nombre de fla	icons prélevés : 7			Echantillons fixés dans : Ethanol						
	Remarques relatives à l'échantillonnage et aux conditions de prélèvement :										

### **BULLETIN D'ANALYSE BIOLOGIQUE**

Rivière : Xwê Ngerê Date prélèvement : 17/09/2019

Station: NGERE Heure: 16:00

Substrat station: ultramafique X aval (m): 421 422 X amont (m): 0

Commande : 2969 - Qualité des eaux SLN 2017 -2020 y aval (m) : 287 610 y amont (m) : 0

Prélèvement effectué par : NE Ref. XY : RGNC91-93 Lambert NC


Analyse effectuée par : Validée par :

	Scores	Scores	1	2	3	4	5	6	7		
	IBNC	IBS	<u> </u>		Ļ			Ļ	· ·	NII	1 Aban
Abr. Nom Taxon	2016	2016								Nb Indiv	Abon relat
Hyd - Hydracarien indéterminé	5	4			1					1	1,12%
Iso - Ins. Odonate Isostictidae Isosticta Isosticta spp.	7	9		1						1	1,12%
Sci - Ins. Coléoptère Helodidae indéterminé	10	3		1						1	1,12%
Ecn - Ins. Trichoptère Ecnomidae indéterminé	6	4						1		1	1,12%
Hep - Ins. Trichoptère Helicopsychidae Helicopsyche Helicopsyche spp.	6	9					3			3	3,37%
Hyt - Ins. Trichoptère Hydroptilidae indéterminé	4	2	30			6		1		37	41,57%
Sym - Ins. Trichoptère Leptoceridae Symphitoneuria Symphitoneuria spp.	9	6	1	5				4		10	11,24%
Tri - Ins. Trichoptère Leptoceridae Triplectides Triplectides spp.	5	7		17					1	18	20,22%
Sim - Ins. Diptère Simuliidae Simulium Simulium spp.	2	5				1				1	1,12%
Cer - Ins. Diptère Ceratopogonidae Ceratopogoninae indéterminé	5	2					1			1	1,12%
Chi - Ins. Diptère Chironomidae Chironomini indéterminé	5	3						1		1	1,12%
Oto - Ins. Diptère Chironomidae Orthocladiinae indéterminé	1	2		1						1	1,12%
Tap - Ins. Diptère Chironomidae Tanypodinae Tanypodinae indéterminé	5	3	5	5	1					11	12,36%
Pse - Ins. Diptère Chironomidae Pseudochironomini Pseudochironomini spp.	9	5		2						2	2,25%
Abondance (nb d'individus sur la station) :		89	Riches	se taxo	nomiqu	ie (nb d	e taxor	ns) :			14
Densité (nb d'individus par m²) :	254	,29	Nombre 2016:	e de tax	ons pa	ırticipar	it au ca	lcul de	l'IBNC		14
INDICE EPT : (indice éphéméroptères, plécoptères et trichoptères)		5	Nombre	e de tax	ons pa	ırticipar	it au ca	lcul de	l'IBS 20	016:	14
Abondance relative en diptères Chironomidae (%):	16	,85									
INDICE Margalef :	2	,90									
INDICE Shannon (H):	1	,80									
Equitabilité de Pielou (E) :	0	,68									
*Les habitats marginaux (couvrant moins de 5% de la surface d de 50% du lit mouillé, D2 entre 25 et 50% et D1 entre 5 et 25%.	u lit moillé) so	nt désignés	par la lettre	M, les h	abitats do	ominants s	ont désig	nés par la	a lettre D,	D3 s'ils couv	rent plus
INDICE BIOTIQUE DE NC (IBNC) 2016 :	5,6	4	QUALIT	ΓÉ ΒΙΟ	LOGIQ	UE BO	NNE				
INDICE BIOSEDIMENTAIRE (IBS)	4,5	7	QUALIT	ΓÉ ΒΙΟ	LOGIQ	UE MÉ	DIOCR	E			

Remarques:

# 2.6 STATION HGL


La carte de localisation de la station est présentée ci-dessous.



Le creek étant à sec le jour de la campagne terrain (16/09/2019), aucun prélèvement n'a pu être effectué.

# 2.7 STATION MEE

La carte de localisation de la station est présentée ci-dessous.



La fiche de relevés terrain et le bulletin d'analyse biologique de la campagne « étiage 2019 » sont présentés ci-après.

# RELEVÉS TERRAIN 2016 DONNÉES MÉSOLOGIQUES ET FAUNISTIQUES

1-IDENTIFICATION DU POINT DE PRÉLÈVEMENT									
Commune :	Thio		Bassin versant :	Dothio					
Nom du cours d'eau :	Xwê Méé		Date :	16/09/2019					
Point de prélèvement (nom ou code) :	Mee		Heure :	13 h 50					
Organisme préleveur:	ВІОЕКО		Prélèvement fait par :	NE					
Coordonnées du point de prélèvement:	Carte IGN	X Aval (m) : Y Amont (m)		Y Aval (m): 287 572 Y Amont (m): 0					
Système de réf./projection X Y :	RGNC91-93 Lambert NC								
Altitude sur carte IGN	0 m								

2- ENVIRONNEMENT GÉNÉRAL	
Environnement global rive droite	forêt
Environnement global rive gauche	forêt
Pente au point de prélèvement	faible
Ganulométrie dominante	roches/dalles
Substrat du B.V. au point de prélèvement	Volcano-sédimentaire
Point de prélèvement sous influence	Sédimentaire -> Ultramafique
Sources d'interférence	
Phénomène anormal observé	

#### 3- CONDITIONS D'OBSERVATION

Hydrologie: Etiage normal

Traces de laisses de crues récentes ou pluie importante ayant précédé l'échantillonnage : Non

Conditions climatiques : soleil

Couleur eau : claire Fond visible : Oui

4- CARACTÉRIS	4- CARACTÉRISATION PHYSICO-CHIMIQUE DU POINT DE PRÉLÈVEMENT									
	Appareil terrain	Propriétaire	Valeurs mesurées in situ	Date dernier étalonnage	Contrôle sonde après terrain	Qualité de la mesure				
Conductivité	Quanta	Bioeko	20,0 °C 210,000 μS/cm Temp. de Réf : 20,4 °C	16/09/2019	Oui					
Oxygène dissous	Quanta	Bioeko	8,16 mg/L 90 % 0°C	16/09/2019	Oui					
pH / Rédox	Quanta	Bioeko	8,5 Unité 385,00 mV	16/09/2019	Oui					
Turbidité	Quanta	Bioeko	2 NTU	16/09/2019	Oui					
Prélèvement d'eau	Prélèvement Oui, Effectué par : NE				Oui s physico-chimiques : riologiques : Non nalyse : CDE	Oui				

5- DESCRIPTION DU POINT DE PRELEVEMENT								
Longueur approximative du bief échantilloné	100,00 m	Faciés d'écoulement : Mouille; Radier; Rapide	Nombre de séquences : 2					
Largeur minimale du lit mouillé	1,50 m	Profondeur minimale	0,05 m					
Largeur maximale du lit mouillé	12,00 m	Profondeur maximale	1,70 m					
Largeur moyenne du lit mouillé	4,50 m	Sur-engravement du lit : Oui	-					
Distance entre les 2 berges	20,00 m	% d'ombrage du lit mouillé	15 %					
Granulométrie des sédiments de la partie non mouillée du lit : R/D : Roche/Dalle; B : Blocs (>250 mm); P/G : Pierres et Galets (25-250mm)								

#### Berges / Rives

_											
	Berge gauche Structure : naturelle						Berge droite Structure : naturelle				
Pente : inclinee					Pente : inclinee						
	%Art	%R/D	%B	%P/G	%Gr	%S/L	%Tr	%La	Végétation	% couverture par la végétation	
Rive droite	0	30	50	20	0	0	0	0	arborée	100	
Rive gauche	0	30	50	20	0	0	0	0 arborée		100	

 $Art: Substrats \ artificiels \ ; \ R/D: Roches/Dalles \ ; \ B: Blocs \ (> 250 \ mm) \ ; \ P/G: Pierres \ et \ galets \ (25 \ \grave{a} \ 250 \ mm) \ ; \ Gr: Graviers \ (2 \ \grave{a} \ 25 \ mm) \ ; \ S/L: Sables \ et \ limons \ (< 2 \ mm) \ ; \ Tr: terre \ (< 2 \ mm) \ ; \ La: latérites \ (< 2 \ mm).$ 

#### Lit mouillé

Matière organique végétale	Feuilles Branches	Importance	faible

Fréquentation animale ou humaine :

Etat du substrat : Périphyton

Latérites	zones lotiques	zones lentiques	globalement sur le site
% de dépôts latéritiques	0	0	0
Colmatage (+,++,+++)			

 $<sup>+:</sup> couche \ facilement \ déplaçable \ ; \ ++ \ quelques \ mm \ d'épaisseur \ ; \ +++ \ plus \ d'un \ cm \ d'épaisseur$ 

Remarques description du point de prélèvement :

6- REPÉRAG	6- REPÉRAGE DES SUBSTRATS (REPRÉSENTATIVITÉ) ET DES CLASSES DE VITESSE DE COURANT										
	Outratuat				Vitesse (V) en cm/s						
Habitabilité	Substrat (Granulométrie le cas échéant)	% de recouvrement	Représentativité (M,D)	Cascade V>150	Rapide 150>V>75	Moyenne 75>V>25	Faible à nulle V<25				
11	Bryophytes	0									
10	Branchages, troncs	1	М				1				
9	Pierres, galets (25 à 250)	20	D			1	2				
8	Litières (+vase)	2	М				1				
7	Hydrophytes	0									
6	Chevelus racinaires	0									
5	Blocs soulevables à la main (> 250 mm)	35	D			1	2				
4	Graviers (2 à 25 mm)	10	D				1				
3	Sables (< 2 mm)	5	D				1				
2	Fines latéritiques (< 2 mm)	0									
1	Roches, dalles	32	D		3	1	2				
0	Algues	0									

Les classes de vitesse caractérisant chaque substrat sont identifiées selon leur ordre d'importance (1, 2, 3 ou 4), la valeur la plus faible correspondant à la classe la plus représentée. M : Marginal : substrat occupant moins de 5% de la superficie totale mouillée du point de prélèvement (< 5%); D : Dominant : substrat occupant 5% et plus de 5% de la superficie totale mouillée du point de prélèvement (5%).

7- TABLEAU D'ÉCHANTILLONNAGE										
			Vitesse		Sub	strat	Végétation aquatique			
	Prélèvement	Substrat	du courant	Hauteur d'eau (cm)	Colmatage	Stabilité	Nature	Abondance (%)		
	P1	Litières(+vase)	faible	5	moyen	instable		0		
Phase 1	P2	Branchages, troncs	faible	15	nul	stable		0		
	P3	Litières(+vase)	faible	25	moyen	stable		0		
	P4	Blocs soulevables à la main	moyenne	25	nul	stable		0		
Phase 2	P5	Blocs soulevables à la main	faible	20	nul	stable	Algues	30		
	P6	Roches, dalles	moyenne	5	nul	stable		0		
	P7	Pierres, galets	moyenne	25	nul	stable		0		
	Nombre de fla	cons prélevés : 0		Echantillons fixés dans : Ethanol						
	Remarques re P3 X2	elatives à l'échantillo	nnage et aux	conditions de	prélèvement :	P1 X2				

### **BULLETIN D'ANALYSE BIOLOGIQUE**

Rivière : Xwê Méé Date prélèvement : 16/09/2019

Station: Mee Heure: 13:50

Substrat station: Volcano-sédimentaire X aval (m): 417 211 X amont (m): 0

Commande : 2969 - Qualité des eaux SLN 2017 -2020 y aval (m) : 287 572 y amont (m) : 0

Prélèvement effectué par : NE Ref. XY : RGNC91-93 Lambert NC

Analyse effectuée par : Validée par :

1	Scores	Scores				<del></del>	l .				
	IBNC	IBS	1	2	3	4	5	6	7		
Abr. Nom Taxon	2016	2016								Nb Indiv	Abon relat
Hyd - Hydracarien indéterminé	5	4			3					3	1,19%
Cep - Ins. Ephéméroptère Leptophlebiidae Celiphlebia Celiphlebia sp.	6	7				17			20	37	14,68%
Leo - Ins. Ephéméroptère Leptophlebiidae Lepeorus Lepeorus sp.	6	7				26		12		38	15,08%
Ng4 - Ins. Ephéméroptère Leptophlebiidae Neampia sp. Neampia sp.	7	9			4					4	1,59%
Par - Ins. Ephéméroptère Leptophlebiidae Paraluma Paraluma sp.	5	4	6		5		17			28	11,11%
Ten - Ins. Ephéméroptère Leptophlebiidae Tenagophila Tenagophila spp.	10	7		4		1	4		2	11	4,37%
Iso - Ins. Odonate Isostictidae Isosticta Isosticta spp.	7	9	2		7		1			10	3,97%
Syn - Ins. Odonate Synthemistidae Synthemis Synthemis spp.	5	8				1				1	0,40%
Hyf - Ins. Coléoptère Hydrophilidae indéterminé	3	3	8		1	3			4	16	6,35%
Ecn - Ins. Trichoptère Ecnomidae indéterminé	6	4		1			1		1	3	1,19%
Hep - Ins. Trichoptère Helicopsychidae Helicopsyche Helicopsyche spp.	6	9		4			4		2	10	3,97%
Hyp - Ins. Trichoptère Hydropsychidae indéterminé	5	5				10		2	2	14	5,56%
Hyt - Ins. Trichoptère Hydroptilidae indéterminé	4	2			3		1		1	5	1,98%
Tri - Ins. Trichoptère Leptoceridae Triplectides Triplectides spp.	5	7	2		2					4	1,59%
Gra - Ins. Trichoptère Leptoceridae Gracilipsodes Gracilipsodes spp.	6	8				2		1	1	4	1,59%
Oec - Ins. Trichoptère Leptoceridae Oecetis Oecetis spp.	5	6	3	1	4	2	5			15	5,95%
Phi - Ins. Trichoptère Philopotamidae indéterminé	7	7							1	1	0,40%
Pol - Ins. Trichoptère Polycentropodidae indéterminé	7	8		1		1			4	6	2,38%
Sim - Ins. Diptère Simuliidae Simulium Simulium spp.	2	5				1		2	1	4	1,59%
Ble - Ins. Diptère Blephariceridae indéterminé	10	8				2		6		8	3,17%
Cer - Ins. Diptère Ceratopogonidae Ceratopogoninae indéterminé	5	2	13			1				14	5,56%
Tan - Ins. Diptère Chironomidae Tanytarsini indéterminé	2	4	2			1				3	1,19%
Oto - Ins. Diptère Chironomidae Orthocladiinae indéterminé	1	2							1	1	0,40%
Tap - Ins. Diptère Chironomidae Tanypodinae Tanypodinae indéterminé	5	3	4							4	1,59%
Psy - Ins. Diptère Psychodidae indéterminé	1	8			2					2	0,79%
Tab - Ins. Diptère Tabanidae sp.	5	6				2			2	4	1,59%
Lim - Ins. Diptère Limoniidae indéterminé	3	6	2							2	0,79%


Abondance (nb d'individus sur la station) :	252	Richesse taxonomique (nb de taxons) :	27
Densité (nb d'individus par m²) :	720	Nombre de taxons participant au calcul de l'IBNC 2016:	27
INDICE EPT : (indice éphéméroptères, plécoptères et trichoptères)	14	Nombre de taxons participant au calcul de l'IBS 2016:	27
Abondance relative en diptères Chironomidae (%):	3,17		
INDICE Margalef:	4,70		
INDICE Shannon (H):	2,84		
Equitabilité de Pielou (E) :	0,86		
*Les habitats marginaux (couvrant moins de 5% de la surface o de 50% du lit mouillé, D2 entre 25 et 50% et D1 entre 5 et 25%	du lit moillé) sont désignés	s par la lettre M, les habitats dominants sont désignés par la lettre D, D3 s'ils cou 	ıvrent plus
INDICE BIOTIQUE DE NC (IBNC)	5,15	QUALITÉ BIOLOGIQUE PASSABLE	
2016 :	,		
INDICE BIOSEDIMENTAIRE (IBS)	5,85	QUALITÉ BIOLOGIQUE BONNE	
2016 :	- /		

#### Remarques:

P1 X2 P3 X2

# 2.8 STATION MOULINET

La carte de localisation de la station est présentée ci-dessous.



La fiche de relevés terrain et le bulletin d'analyse biologique de la campagne « étiage 2019 » sont présentés ci-après.

# RELEVÉS TERRAIN 2016 DONNÉES MÉSOLOGIQUES ET FAUNISTIQUES

1-IDENTIFICATION DU F	POINT DE PRÉLÈVEMENT			
Commune :	Thio		Bassin versant :	Bwa Néca
Nom du cours d'eau :	Bwa Néca		Date :	17/09/2019
Point de prélèvement (nom ou code) :	MOULINET		Heure :	08 h 00
Organisme préleveur:	BIOEKO		Prélèvement fait par :	NE
Coordonnées du point de prélèvement:	Carte IGN	X Aval (m) : Y Amont (m)		Y Aval (m): 286 824 Y Amont (m): 0
Système de réf./projection X Y :	RGNC91-93 Lambert NC			
Altitude sur carte IGN	0 m			

2- ENVIRONNEMENT GÉNÉRAL	
Environnement global rive droite	végétation arbustive
Environnement global rive gauche	végétation arbustive
Pente au point de prélèvement	forte
Ganulométrie dominante	roches/dalles
Substrat du B.V. au point de prélèvement	ultramafique
Point de prélèvement sous influence	Sédimentaire -> Ultramafique
Sources d'interférence	
Phénomène anormal observé	

### 3- CONDITIONS D'OBSERVATION

Hydrologie: Etiage normal

Traces de laisses de crues récentes ou pluie importante ayant précédé l'échantillonnage : Non

Conditions climatiques : soleil

Couleur eau : claire Fond visible : Oui

4- CARACTÉRIS	SATION PHYSIC	D-CHIMIQUE DU	POINT DE PRÉLÈVEMENT			
	Appareil terrain	Propriétaire	Valeurs mesurées in situ	Date dernier étalonnage	Contrôle sonde après terrain	Qualité de la mesure
Conductivité	Quanta	Bioeko	18,0 °C 240,000 µS/cm Temp. de Réf : 18,5 °C	16/09/2019	Oui	
Oxygène dissous	Quanta	Bioeko	7,79 mg/L 83 % 0°C	16/09/2019	Oui	
pH / Rédox	Quanta	Bioeko	8,7 Unité 388,00 mV	16/09/2019	Oui	
Turbidité	Quanta	Bioeko	8 NTU	16/09/2019	Oui	
Prélèvement d'eau	Oui, Effectué pa heure prélèvem distance /berge	ent : 08:00	profondeur eau (m) : 0		s physico-chimiques : riologiques : Non	Oui

5- DESCRIPTION DU POINT DE PREI	5- DESCRIPTION DU POINT DE PRELEVEMENT						
Longueur approximative du bief échantilloné	50,00 m	Faciés d'écoulement : Mouille; Autre	Nombre de séquences : 2				
Largeur minimale du lit mouillé	0,30 m	Profondeur minimale	0,05 m				
Largeur maximale du lit mouillé	4,00 m	Profondeur maximale	0,35 m				
Largeur moyenne du lit mouillé	1,50 m	Sur-engravement du lit : Non					
Distance entre les 2 berges	20,00 m	% d'ombrage du lit mouillé	10 %				

Granulométrie des sédiments de la partie non mouillée du lit : R/D : Roche/Dalle; B : Blocs (>250 mm); P/G : Pierres et Galets (25-250mm); Gr : Graviers (0.05-25mm)

#### Berges / Rives

	Berge gauche Structure : naturelle							B <sub>r</sub> Struc	erge droite ture : naturelle	
		Pente	: inclinee	ee Pente : verticale						
	%Art	%R/D	%B	%P/G	%Gr	%S/L	%S/L %Tr %La Végétation % par l			% couverture par la végétation
Rive droite	0	50	20	15	0	0	5	10	arbustive	100
Rive gauche	0	70	15	5	0	0	10	0	arbustive	100

 $Art: Substrats \ artificiels\ ;\ R/D: Roches/Dalles\ ;\ B: Blocs\ (>250\ mm)\ ;\ P/G: Pierres\ et\ galets\ (25\ \grave{a}\ 250\ mm)\ ;\ Gr: Graviers\ (2\ \grave{a}\ 25\ mm)\ ;\ S/L: Sables\ et\ limons\ (<2\ mm)\ ;\ Tr: terre\ (<2\ mm)\ ;\ La: latérites\ (<2\ mm).$ 

#### Lit mouillé

		Matière organique végétale	Branches Tronc	Importance	faible
--	--	----------------------------	----------------	------------	--------

#### Fréquentation animale ou humaine :

Etat du substrat : Dépots latéritiques

Latérites	zones lotiques	zones lentiques	globalement sur le site	
% de dépôts latéritiques	10	50	40	
Colmatage (+,++,+++)	+	+	+	

<sup>+ :</sup> couche facilement déplaçable ; ++ quelques mm d'épaisseur ; +++ plus d'un cm d'épaisseur

Remarques description du point de prélèvement :

6- REPÉRAG	E DES SUBSTRATS (REI	PRÉSENTATIVITÉ)	ET DES CLASSES DE	E VITESSE DE	COURANT					
	Culp atmat				Vitesse (V) en cm/s					
Habitabilité	Substrat (Granulométrie le cas échéant)	% de recouvrement	Représentativité (M,D)	Cascade V>150	Rapide 150>V>75	Moyenne 75>V>25	Faible à nulle V<25			
11	Bryophytes	0								
10	Branchages, troncs	1	М				1			
9	Pierres, galets (25 à 250)	10	D				1			
8	Litières (+vase)	1	М							
7	Hydrophytes	0								
6	Chevelus racinaires	0								
5	Blocs soulevables à la main (> 250 mm)	15	D				1			
4	Graviers (2 à 25 mm)	4	М				1			
3	Sables (< 2 mm)	2	М				1			
2	Fines latéritiques (< 2 mm)	0								
1	Roches, dalles	68	D			1	2			
0	Algues	0								

Les classes de vitesse caractérisant chaque substrat sont identifiées selon leur ordre d'importance (1, 2, 3 ou 4), la valeur la plus faible correspondant à la classe la plus représentée. M : Marginal : substrat occupant moins de 5% de la superficie totale mouillée du point de prélèvement (< 5%); D : Dominant : substrat occupant 5% et plus de 5% de la superficie totale mouillée du point de prélèvement (5%).

7- TABLEA	U D'ÉCHANTIL	LONNAGE						
			Vitesse		Sub	strat	Végétation	aquatique
	Prélèvement	Substrat	du courant	Hauteur d'eau (cm)  15  1  20  5  10  20  10	Colmatage	Stabilité	Nature	Abondance (%)
	P1	Graviers	faible	15	faible	moyennem ent stable		0
Phase 1	P2	Sables	faible	1	faible	instable		0
	P3	Branchages, troncs	faible	20	Abondance (%)  15 faible moyennem ent stable 0  1 faible instable 0  20 nul moyennem ent stable 0  5 nul stable 0  10 faible stable 0  20 moyen stable 0			
	P4	Roches, dalles	moyenne	5	nul	stable		0
	P5	Roches, dalles	faible	10	faible	stable		0
Phase 2	P6	Blocs soulevables à la main	faible	20	moyen	stable		0
	P7	7 Pierres, galets faible 10		10	faible			0
	Nombre de fla	cons prélevés : 7			Echantillons	fixés dans : Et	hanol	
	Remarques re	elatives à l'échantillo	nnage et aux	conditions de	prélèvement	•		

### **BULLETIN D'ANALYSE BIOLOGIQUE**

Rivière : Bwa Néca Date prélèvement : 17/09/2019

Station: MOULINET Heure: 08:00

Substrat station: ultramafique X aval (m): 420 467 X amont (m): 0

Commande : 2969 - Qualité des eaux SLN 2017 -2020 y aval (m) : 286 824 y amont (m) : 0

Prélèvement effectué par : NE Ref. XY : RGNC91-93 Lambert NC

Analyse effectuée par : Validée par :

	Scores IBNC	Scores IBS	1	2	3	4	5	6	7		
Abr. Nom Taxon	2016	2016								Nb Indiv	Abon relat
Iso - Ins. Odonate Isostictidae Isosticta Isosticta spp.	7	9		2						2	1,63%
Hyf - Ins. Coléoptère Hydrophilidae indéterminé	3	3						3	5	8	6,50%
Ecn - Ins. Trichoptère Ecnomidae indéterminé	6	4							1	1	0,81%
Hep - Ins. Trichoptère Helicopsychidae Helicopsyche Helicopsyche spp.	6	9				1				1	0,81%
Hyt - Ins. Trichoptère Hydroptilidae indéterminé	4	2		1				5	1	7	5,69%
Sym - Ins. Trichoptère Leptoceridae Symphitoneuria Symphitoneuria spp.	9	6	34	14	7		6	6	10	77	62,60%
Tri - Ins. Trichoptère Leptoceridae Triplectides Triplectides spp.	5	7		8				1		9	7,32%
Cer - Ins. Diptère Ceratopogonidae Ceratopogoninae indéterminé	5	2	1	1						2	1,63%
Tan - Ins. Diptère Chironomidae Tanytarsini indéterminé	2	4							2	2	1,63%
Oto - Ins. Diptère Chironomidae Orthocladiinae indéterminé	1	2	1	2		3				6	4,88%
Tap - Ins. Diptère Chironomidae Tanypodinae Tanypodinae indéterminé	5	3	1					3		4	3,25%
Pse - Ins. Diptère Chironomidae Pseudochironomini Pseudochironomini spp.	9	5	2					1		3	2,44%
Lim - Ins. Diptère Limoniidae indéterminé	3	6		1						1	0,81%
Abondance (nb d'individus sur la station) :	1	123	Richesse taxonomique (nb de taxons) :						13		
Densité (nb d'individus par m²) :	351	,43	Nombre 2016:	e de tax	ons pa	ırticipar	nt au ca	lcul de	l'IBNC		13
INDICE EPT: (indice éphéméroptères, plécoptères et trichoptères)		5	Nombre	e de tax	ons pa	ırticipar	nt au ca	lcul de	l'IBS 20	016:	13
Abondance relative en diptères Chironomidae (%):	12	,20									
INDICE Margalef:	2	,49									
INDICE Shannon (H):	1	,49									
Equitabilité de Pielou (E) :		,58									
*Les habitats marginaux (couvrant moins de 5% de la surface de 50% du lit mouillé, D2 entre 25 et 50% et D1 entre 5 et 25%	du lit moillé) soi	nt désignés	par la lettre	e M, les h	abitats do	ominants s	sont désig	nés par la	a lettre D,	D3 s'ils couv	rent plus
INDICE BIOTIQUE DE NC (IBNC) 2016 :	5,0		QUALI <sup>-</sup>								
INDICE BIOSEDIMENTAIRE (IBS) 2016:	4,7	7	QUALI <sup>-</sup>	ΓÉ ΒΙΟ	LOGIQ	UE MÉ	DIOCR	E			

Remarques:

### **3 EVOLUTION DES RESULTATS**

Tableau 4 : Evolution de l'indice Biosédimentaire depuis 2012. (en gris note calculée avec moins de 7 taxons indicateurs)

Stations		IBS	2011		IBS 2016			
Stations	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tomuru amont	5,89	6,08	6,69	6,41	A sec	A sec	A sec	5,92
Mue	4,50	-	5,65	5,61	5,15	4,57	4,74	5,66
St Martin	A sec	A sec	A sec	A sec				
Nedoro	A sec	A sec	A sec	A sec				
Ngere	6,00	5,00	6,55	6	A sec	A sec	5,50	4,57
HGL	-	-	-	-	A sec	A sec	A sec	A sec
Mee	-	-	-	-	5,55	5,48	5,91	5,85
Moulinet	7,75	1	6,11	6,83	5,06	Pas assez d'eau	5,19	4,77

Classes de qualité biologique pour l'IBS	S IBS-2011¶	IBS-2016¶		
Mauvaise	IBS ≤ 4,25	IBS ≤ 4,35		
Médiocre	4,25 < IBS ≤ 5,00	4,35 < IBS ≤ 4,90		
Passable	5,00 < IBS I≤ 5,75	4,90 < IBS ≤ 5,45		
Bonne	5,75 < IBS ≤ 6,50	5,45 < IBS ≤ 6,00		
Très bonne	IBS > 6,50	IBS > 6,00		

L'inventaire réalisé en 2019 a pu être réalisé sur 5 stations du réseau de suivi du massif. Depuis 2012, 3 stations n'ont jamais été prélevées (St Martin, Nedoro et HGL). La station Nedoro en plus d'être à sec présente un accès dangereux. La station Mee située en milieu forestière semble stable depuis 2016 avec une note IBS qui progresse d'année en année. La station Mue, déclassée en 2017 et 2018, présente cette année une bonne qualité IBS.

Les stations Tomuru amont, Ngere et Moulinet ont pu être suivi en 2019, toutefois l'absence de données sur une période de suivi continue dans le temps, empêche toute analyse de tendance sur le moyen terme.

